



SKYreport

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO

Método:

...

Análise:

Realizada análise comparativa com a tomografia computadorizada do dia 24/01/2026.

O presente exame permitiu melhor caracterização do conteúdo que preenche parcialmente os seios esfenoidal e maxilar esquerdos, com isossinal ao líquido em todas as sequências, formando nível.

Também permitiu melhor caracterização da descontinuidade na parede anterolateral do seio esfenoidal esquerdo, estimada em 0,4 cm, com herniação de pequena parte do giro para-hipocampal ao interior do seio esfenoidal, apresentando-se gliótico.

Restante do parênquima encefálico com intensidade de sinal habitual.
Sela turca vazia.

Meningoceles dos cavos de Meckel, nas placas cribiformes adjacentes aos bulbos olfatórios, assim como na projeção das *pars vascularis* dos bulbos jugulares.

...

Impressão Diagnóstica:

- Sinais compatíveis com fístula esfenoidal esquerda associada a pequena encefalocele do parênquima adjacente.

- Sela turca vazia e meningoceles em alguns forames da base do crânio, achados que sugerem hipertensão intracraniana.

OBS: atenção este é apenas um modelo sugerido pela equipe Neurosky de termos que podem ser, eventualmente, utilizados em laudos radiológicos. A utilização do mesmo é de total responsabilidade do profissional médico que emite o parecer. A Neurosky ou seus membros não se responsabilizam por este ou suas implicabilidades.